

# L'àcid peracètic, la millor alternativa al clor per desinfectar maduixes

## Segons una recerca liderada per la UdL i publicada a 'International Journal of Food Microbiology'

L'àcid peracètic [ <https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0130881.xml> ] és la millor alternativa a la desinfecció per clor per a les maduixes davant de possibles contaminacions des de la collita fins a la taula, principalment per [norovirus](https://ca.wikipedia.org/wiki/Norovirus) [ <https://ca.wikipedia.org/wiki/Norovirus> ] que provoquen gastroenteritis i bacteris com la [salmonel·la](https://ca.wikipedia.org/wiki/Salmonel·la) [ <https://ca.wikipedia.org/wiki/Salmonel%C2%B7la> ] (Salmonella spp.) o la [listèria](https://ca.wikipedia.org/wiki/List%C3%A8ria) [ <https://ca.wikipedia.org/wiki/List%C3%A8ria> ] (Listeria monocytogenes). Així ho conclou una recerca liderada per la Universitat de Lleida (UdL) publicada a la revista International Journal of Food Microbiology. [L'estudi](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160520303044) [ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160520303044> ], realitzat conjuntament amb l'IRTA i l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA-CSIC) de València, ha analitzat l'efectivitat de diferents alternatives al clor per afegir a l'aigua de rentat de les baies.




Foto: Jordi Ortiz i Iolanda Nicolau

El risc que comporten els problemes de seguretat dels subproductes derivats de la desinfecció del clor a la indústria de la fruita ha impulsat la recerca de desinfectants alternatius. Les investigadores i els investigadors, encapçalats per la catedràtica de Tecnologia d'Aliments de la UdL Immaculada Viñas, han avaluat l'àcid peracètic, l'aigua oxigenada o peròxid d'hidrogen, l'àcid cítric (AC), l'àcid làctic (AL) i l'àcid acètic (AA) en diferents dosis i temps de descontaminació.

Els resultats del treball, que forma part de la tesi del doctorand de la UdL Jordi Ortiz-Solà, indiquen que les millors concentracions – com alternativa a 100 parts per milió (ppm) de clor, utilitzat per a la desinfecció de diferents matrius en les indústries alimentàries- han estat de 80 ppm per a l'àcid peracètic, un 5% per a peròxid d'hidrogen i un 2,5% per a àcids orgànics (AL, AA i AC) després del tractament de 2 minuts.

El primer ha resultat "la substància desinfectant òptima, pels seus efectes microbicides, baix cost i baixa concentració necessària per eliminar els patògens", explica Viñas. A més, l'àcid peracètic manté la qualitat de l'aigua de rentat després del seu ús, sense la presència de patògens en la mateixa, permetent la recirculació i evitant així possibles contaminacions creuades. "Aquest punt és també important, ja que es pot garantir la seguretat del producte, sense tenir grans despeses econòmiques i malbaratament d'aigua", afegeix la catedràtica.

Els investigadors també plantegen la necessitat de futurs estudis sobre la combinació de l'àcid peracètic amb altres tecnologies no tèrmiques, com la llum ultraviolada assistida per aigua (UV-C), per millorar la desinfecció de les maduixes, "sobretot aquelles que van destinades a un processament o congelació, ja que s'ha vist que els principals problemes amb els virus entèrics -com el norovirus-, s'han trobat en aquest tipus de productes", destaca Viñas.

Text: Oficina de premsa [ <http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Lacid-peracetic-la-millor-alternativa-al-clor-per-desinfectar-maduixes/> ]